

Botu-Sure

* ANTHRAX VACCINE

Reg. Nr. G4258 Wet 36/1947

NSO V18/24.4/1436 Wet 13/2003

LET WEL

VIR DIE AKTIEWE IMMUNISERING VAN BEESTE EN SKAPE TEEN MILTSIEKTE EN LAMSIEKTE.

BEWARINGSINSTRUKSIES

Bewaar tussen 2 °C tot 8 °C in 'n yskas. Moenie vries nie. Beskerm teen lig. Skud goed voor gebruik.

SAMESTELLING

Bacillus anthracis ongekapsuleerde avirulente Sterne 34F₂ stam aktiewe spore
Clostridium botulinum Tipes C en D toksoïede

Bevat toksoïede verkry van kulture van *Clostridium botulinum* tipe C en tipe D, en lewendige spore van 'n ongekapsuleerde avirulente stam (Sterne 34F₂) van *Bacillus anthracis*.

WAARSKUWINGS

- MOET NIE DIERE BINNE 21 DAE NA DIE LAASTE INENTING VIR MENSLIKE GEBRUIK SLAG NIE.
- Slegs gesonde diere moet ingeënt word.
- Hipersensitiwiteitsreaksies mag per geleentheid voorkom. In sulke gevalle moet gepaste behandeling sonder versuim toegedien word.
- 'n Tydelike swelsel mag voorkom op die plek waar die entstof toegedien is, en sommige diere mag 'n matige styging in liggaamstemperatuur vir een of twee dae toon.
- Soos vir alle entstowwe, kan absolute immuniteit nie in alle diere gewaarborg word nie. Dit is raadsaam om 'n veearts rakende bykomende beheermaatreëls te raadpleeg.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie entstof breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg die veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREËLS

- Gepaardgaande toediening van antibiotika aan ingeënte diere word teenaangedui, aangesien die antibiotikum met die werking van die entstof sal inmeng.
- Antibiotika moet nie gegee word nie vir sewe dae voor en na inenting.
- Gebruik slegs steriele naalde en behoorlik gesteriliseerde apparaat vir inenting. Ten einde toepaslike higiëne te handhaaf, is dit raadsaam om die naalde so dikwels as moontlik met skoon steriele naalde te vervang.

- Moenie hierdie entstof met enige ander veteriniere medisinale produk vermeng nie.
- Gooi houers wat net gedeeltelik gebruik is weg na inenting.
- Raadpleeg u veearts rakende herinentings.

GEBRUIKSAANWYSINGS

- GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.
- Skud goed voor gebruik.
- BOTU-SURE + ANTHRAX Vaccine moet deur onderhuidse inspuiting toegedien word.
- Immuniteit ontwikkel binne 3 tot 4 weke na inokulasie en duur vir ten minste een jaar.

DOSIS

BEESTE

- Dien 4 ml deur onderhuidse inspuiting toe.
- Kalwers moet vir die eerste keer teen 4 tot 6 maande ouderdom ingeënt word. 'n Skraag dosis inenting met 'n entstof wat *Clostridium botulinum* Tipes C en D toksoïede bevat moet 4 tot 6 weke later toegedien word.
- Volwasse diere wat nooit voorheen geënt was nie, moet met BOTU-SURE + ANTHRAX Vaccine ingeënt word. 'n Skraag dosis inenting met 'n entstof wat *Clostridium botulinum* Tipes C en D toksoïede bevat moet 4 tot 6 weke later toegedien word.
- Daarna moet 'n enkele skraag dosis jaarliks toegedien word.

SKAPE

- Dien 2 ml deur onderhuidse inspuiting toe.
- Skape moet vir die eerste keer teen 3 tot 4 maande ouderdom ingeënt word. 'n Skraag dosis inenting met 'n entstof wat *Clostridium botulinum* Tipes C en D toksoïede bevat moet 4 tot 6 weke later toegedien word.
- Volwasse diere wat nooit voorheen geënt was nie, moet met BOTU-SURE + ANTHRAX Vaccine ingeënt word. 'n Skraag dosis inenting met 'n entstof wat *Clostridium botulinum* Tipes C en D toksoïede bevat moet 4 tot 6 weke later toegedien word.
- Raadpleeg u veearts rakende jaarlikse skraag dosis.
- Herinenting mag nodig wees voor enige chirurgiese prosedures wat wonde mag veroorsaak, insluitende lam, stert afsny, kastrasie en skeer.
- Verseker dat die naald die vel gepenetreer het voordat die produk ingespuut word by diere met lang vag.

AANBIEDING

Bottels wat 50 ml en 250 ml bevat



Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07,
Eenheid 45C, 45 Parkview straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31,
Centurion, 0157, Suid Afrika. Tel: 0861 247 463.