



OPGIETMIDDEL



Reg. Nr. G4197 Wet 36/1947 NSO V19/18.2/1442 Wet 13/2003

BOSLUIS + RONDEWURM BEHEER

TWEE AKTIEWE BESTANDELE
FIPRONIEL 0,9 % + ABAMEKTIEN 0,5 %



- ✓ Gereed-vir-gebruik opgietsmiddel
- ✓ Nawerkende aksie
- ✓ Beheer bloubosluisse
- ✓ Beheer meer-gasheer bosluisse
- ✓ Geregistreeer teen Piretroïed weerstandige bloubosluisse
- ✓ Breë-spektrum rondewurm beheer





Reg. Nr. G4197 Wet 36/1947
NSD V19/18.2/1442 Wet 13/2003

SLEGS VIR UITWENDIGE DIERGEBRUIK

VERSIGTIG

SAMESTELLING

Fiproniel 0,9 % m/v
† Abamektien 0,5 % m/v

AANDUIDINGS

'n Gereed-vir-gebruik antiparasitiese middel vir beeste.

BERGING

Stoor teen of onder 25 °C, beskerm teen sonlig.

WAARSKUWINGS

- MOENIE DIERE VIR MENSlike VERBRUIK SLAG BINNE 105 DAE NA LAASTE AANWENDING NIE.
- MOENIE OP LAKTERENDE DIERE AANWEND INDIEN DIE MELK BESTEM IS VIR MENSlike VERBRUIK NIE.
- Moenie op nat diere aanwend nie, óf as reën kort na aanwending verwag word nie.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREËLS

- Dra handskoene gedurende aanwending.
- In geval van kontak met die vel, was met baie water.
- Moenie eet, rook of drink gedurende aanwending van die produk nie.
- Moenie houers vir enige ander doel hergebruik nie.
- Raak ontslae van gebruikte houers deur dit te begrawe of te brand.
- Vermy besoedeling van waterbronne.

GEbruIKSAANWYSINGS:

GEbruIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Aanwending

- Gereed-om-te-gebruik opgiemiddel.
- Wend aan in twee strepe, aan beide kante van die werwelkanaal, van die kop kroon tot die stertwortel.

Dosis

- 1 ml per 10 kg.

DOELTREFFENDHEID: UITWENDIGE PARASIETE	Beheer vir
Bloubosluis (<i>Boophilus spp.</i>) insluitend piretroïed weerstandige stamme.	* 21 dae ** 28 dae
Rooipootbosluis (<i>Rhipicephalus evertsi</i>)	* 21 dae
Bontbosluis (<i>Amblyomma spp.</i>)	* 14 dae
Bontpootbosluis (<i>Hyalomma spp.</i>)	* 7 dae ** 14 dae
Bruinoorbosluis (<i>R.appendiculatus</i>)	* 7 dae

* Beheer ≥ 90 % doeltreffend

** Hulp in beheer = 60 - 89 % doeltreffend

DOELTREFFENDHEID: INWENDIGE PARASIETE	Onvolwasse	Volwasse
Bruinmaagwurm (<i>Ostertagia spp.</i>)	*	*
Haarwurm (<i>Haemonchus placei</i>)	*	*
Haakwurm (<i>Bunostomum phlebotomum</i>)	*	*
Maagbankrotwurm (<i>Trichostrongylus axei</i>)	*	*
Knoppieswurm (<i>Oesophagostomum spp.</i>)	*	*
Beesbankrotwurm (<i>Cooperia spp.</i>)	*	*

* Beheer ≥ 90 % doeltreffend

† Makrosikliese laktoon

KAH/PM011/2022/1