

# ATTILA<sup>①†</sup>

Reg. Nr. G4197 Wet 36/1947

NS0 V19/18.2/1442 Wet 13/2003

## SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGEBRUIK

### VERSIGTIG

#### SAMESTELLING

Fipronil 0,9 % m/v  
† Abamektien 0,5 % m/v

#### AANDUIDINGS

'n Gereed-vir-gebruik antiparasitiese middel vir beeste.

#### BERGING

Stoor teen of onder 25 °C, beskerm teen sonlig.

#### WAARSKUWINGS

- MOENIE DIERE VIR MENSLIKE VERBRIUK SLAG BINNE 105 DAE NA LAASTE AANWENDING NIE.
- MOENIE OP LAKTERENDE DIERE AANWEND INDIEN DIE MELK BESTEM IS VIR MENSLIKE VERBRIUK NIE.
- Moenie op nat diere aanwend nie, óf as reën kort na aanwending verwag word nie.
- Hou buite bereik van kinders, oningesigte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

#### VOORSORGMAATREËLS

- Dra handskoene gedurende aanwending.
- In geval van kontak met die vel, was met baie water.
- Moenie eet, rook of drink gedurende aanwending van die produk nie.
- Moenie houers vir enige ander doel hergebruik nie.
- Raak ontslae van gebruikte houers deur dit te begrawe of te brand.
- Vermy besoedeling van waterbronne.

#### GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

##### Aanwending

- Gereed-om-te-gebruik opgielmiddel.
- Wend aan in twee strepe, aan beide kante van die werwelkanaal, van die kop kroon tot die stertwortel.

##### Dosis

- 1 ml per 10 kg.

DOELTREFFENDHEID: UITWENDIGE PARASIETE	Beheer vir
Bloubosluis ( <i>Boophilus spp.</i> ) insluitend piretroid weerstandige stamme	* 21 dae ** 28 dae
Rooiopootbosluis ( <i>Rhipicephalus evertsi</i> )	* 21 dae
Bontbosluis ( <i>Amblyomma spp.</i> )	* 14 dae
Bontpootbosluis ( <i>Hyalomma spp.</i> )	* 7 dae ** 14 dae
Bruinoorbosluis ( <i>R.appendiculatus</i> )	* 7 dae

\* Beheer ≥ 90% doeltreffend

\*\* Hulp in beheer = 60 – 89 % doeltreffend

DOELTREFFENDHEID: INWENDIGE PARASIETE	Onvolwasse	Volwasse
Bruinmagwurm ( <i>Ostertagia spp.</i> )	*	*
Haarwurm ( <i>Haemonchus placei</i> )	*	*
Haakwurm ( <i>Bunostomum phlebotomum</i> )	*	*
Maagbankrotwurm ( <i>Trichostrongylus axei</i> )	*	*
Knoppieswurm ( <i>Oesophagostomum spp.</i> )	*	*
Beesbankrotwurm ( <i>Cooperia spp.</i> )	*	*

\* Beheer ≥ 90% doeltreffend

† Makrosikliese laatton

**Registration holder:** Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Tel: 0861 247 463.

