

MOXIDOSE^{①†}

Reg. Nr. G4213 Wet 36/1947

NS0V20/18.1.2/1445 Wet 13/2003

SLEGS VIR DIEREGERBUIK

Orale antiparasitiese middel vir skape

AANDUIDINGS: Vir die behandeling en beheer van rondewurms en neuswurm in skape

VERSIGTIG

BERGING: BERG ONDER 25 °C IN 'N KOEL, DONKER DROË PLEK

SAMESTELLING: Moksidektien 0.1 % m/v

WAARSKUWINGS:

- MOENIE SKAPE VIR MENSLIKE VERBRUIK BINNE 14 DAE NA LAASTE BEHANDELING SLAG NIE.
- Moenie in diere gebruik waarvan die melk vir menslike gebruik aangewend word nie.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREËLS:

- Skape moet ten minste 3 weke voor behandeling teen klostridiale infeksies bv. Bloednier (enterotoksemie) ingeënt word.
- Vernietig leë houers en moenie vir enige ander doelwit aanwend nie.
- Moenie eet, drink of rook terwyl die produk hanteer word nie.
- Wanneer buite gebruik word, stoor die bottel in 'n karton om te beskerm teen sonlig.
- Was hande deeglik na gebruik.
- Moenie verdun of met enige ander produk meng nie.

GEbruik SLEGS VOLGENS DIE VOLGENDE AANWYSINGS:

Skape: Doseer oraal teen 2 ml per 10kg lewende massa

Dosis tabel	
Liggaamsmassa (kg)	Dosis volume (ml)
Tot en met 10	2
11 – 20	4
21 – 30	6
31 – 40	8
41 – 50	10

VEILIGHEID:

Moxidose is veilig teen die voorgeskrewe dosisse. Dit kan gebruik word in skape van alle ouderdomme, insluitend dragtige en teeldiere.

DOELTREFFENDHEID:

Interne Parasiete	Onvolwasse	Volwasse	Nawerking+
RONDEWURMS			
Haarwurm (<i>Haemonchus contortus</i>)	*	*	28 dae
Bruinmaagwurm (<i>Teladorsagia circumcincta</i>)	*	*	28 dae
Bankrotwurm (<i>Trichostrongylus colubriformis</i>)	*	*	
Langnekbankrotwurm (<i>Nematodirus spathiger</i>)	*	**	
Witbankrotwurm (<i>Strongylus papillosus</i>)	*	X	
Haakwurm (<i>Gaigeria pachyscelis</i>)	*	*	28 dae
Knoppieswurm (<i>Oesophagostomum columbianum</i>)	*	*	28 dae
Grootbekdermwurm (<i>Chabertia ovina</i>)	*	*	
Longwurm (<i>Dictyocaulus filaria</i>)	*	*	

* Beheer = ≥ 90 % effektief

** Help in beheer: 60% - 89% effektief

+ Interval tussen behandeling en herbesmetting X Oneffektief

Neuswurm (*Oestrus ovis*):

Moxidose beheer neuswurm larwes (eerste, tweede en derde stadium larwes)

† Makrosikliese laktoon



Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Tel: 0861 247 463.