

MAXITET 13.5%

Reg. No./Nr. G3586 Act/Wet 36/1947
[NSO] V05/17.1.2/295 Act/Wet 13/2003

LONG- AND SHORT ACTING OXYTETRACYCLINE INJECTION.

For the treatment of heartwater, tick-borne gallsickness (Anaplasmosis), pneumonia, navel-ill, joint-ill and footrot in stock and strangles in horses.

LANG- EN KORTWERKENDE OKSITETRASIEN INSPUITING.

Vir die behandeling van hartwater, bosluisoorgedraagde galsiekte (Anaplasmosis), longontsteking, naelstringontsteking, septiese gewrigsontsteking en vrotpootjie by vee en nuwesiekte by perde.

Store in a cool, dark place.
Bewaar in 'n koel, donker plek.

COMPOSITION / SAMESTELLING:
Oxytetracycline / Oksitetrasiklien 135 mg / ml



Registration Holder / Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Pty) Ltd.,
Reg. No. 2004/021847/07, Unit 45C, 45 Parkview Street, Highway Business Park,
Rooihuiskraal Ext. 31, Centurion, 0157, South Africa. Tel: 0861 247 463.



FOR ANIMAL USE ONLY**MAXITET 13,5%**

Reg. No. G3586 Act 36/1947

NSO V05/17.1.2/295 Act 13/2003

Long- and short acting oxytetracycline injection.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store in a cool, dark place.

COMPOSITION

A sterile, stable solution of oxytetracycline. It contains the equivalent of oxytetracycline hydrachloride 135 mg / ml (as the magnesium complex).

INDICATIONS

For the treatment of heartwater, tick-borne gallsickness (Anaplasmosis), pneumonia, navel-ill, joint-ill and footrot in stock and strangles in horses.

WARNINGS**Long- and short acting dose:**

- TREATED ANIMALS MUST NOT BE SLAUGHTERED FOR HUMAN CONSUMPTION WITHIN 28 DAYS OF LAST TREATMENT.
- MILK FROM TREATED COWS MUST NOT BE USED FOR HUMAN CONSUMPTION WITHIN 7 DAYS OF TREATMENT.
- Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
- Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE - USE ONLY AS DIRECTED**Administration**

Intramuscular, subcutaneous or intravenous injection.

When injecting intramuscularly, inject into the muscle of the mid-neck area using a needle of not more than 30 mm in length.

Do not inject more than 20 ml at one site.

Massage the area after injection to enhance absorption and minimise swelling.

When using the intravenous route, inject slowly and pause if any discomfort is shown.

THE LONG ACTING DOSE MUST BE ADMINISTERED BY THE INTRAMUSCULAR ROUTE ONLY.**Dosage and Indications: Normal Use**

Animal	Disease	Dose
Cattle	Hartwater and tick-borne gallsickness (Anaplasmosis)	8 ml / 100 kg body mass daily for 3 days.
	Pneumonia, navel-ill, footrot and joint-ill	8 ml / 100 kg body mass daily for 3 days.
Horses	Footrot, navel-ill, joint-ill, pneumonia and strangles	8 ml / 100 kg body mass daily for 3 days.
Sheep and goats	Heartwater	4 ml / 50 kg body mass daily for 3 days.
	Footrot, pneumonia, navel-ill and joint-ill	4 ml / 50 kg body mass daily for 3 days.
Pigs	Footrot and pneumonia	2 ml / 30 kg body mass daily for 3 days.

Dosage and Indications: Long Acting Use (When a higher efficacy and longer action are required)

Animal	Disease	Dose
Cattle	Hartwater and tick-borne gallsickness (Anaplasmosis)	16 ml / 100 kg body mass. Repeat after 3 days if necessary.
	Pneumonia, navel-ill, footrot and joint-ill	16 ml / 100 kg body mass. Repeat after 3 days if necessary.
Sheep and goats	Heartwater	8 ml / 50 kg body mass. Repeat after 3 days if necessary.
	Footrot, pneumonia, navel-ill and joint-ill	8 ml / 50 kg body mass. Repeat after 3 days if necessary.

N.B. For rapid recovery a prompt and accurate diagnosis is essential. It is, therefore, always advisable to consult your veterinarian for a correct diagnosis.

SLEGS VIR DIEREGBRUIK**MAXITET 13,5%**

Reg. Nr. G3586 Wet 36/1947

NSO V05/17.1.2/295 Wet 13/2003

Lang- en kortwerkende oksitetrasiklien inspuiting.

BERGINGSAAWYSINGS

Bewaar in 'n koel, donker plek.

SAMESTELLING

'n Steriele, stabiele oplossing van oksitetrasiklien wat die ekwivalent van oksitetrasiklienhydrochloried 135 mg / ml (as die magnesiumkompleks) bevat.

AANDUIDINGS

Vir die behandeling van hartwater, bosluisoorgedraagde galsiekte (Anaplasrose), longontsteking, naelstringontsteking en septiese gewrigsontsteking by vee en nuwesiekte by perde.

WAARSKUWINGS**Langwerkende- en kortwerkende dosis**

- BEHANDELDE DIERE MOENIE BINNE 28 DAE NA LAASTE BEHANDELING VIR MENSLIKE VERBRUIK GESLAG WORD NIE.
- MELK VAN BEHANDELDE KOEIE MOENIE VIR MENSLIKE VERBRUIK BINNE 7 DAE NA BEHANDELING GEBRUIK WORD NIE.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder 'n wye verskidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GBRUIKSAANYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI**Toediening**

Binnespiers, onderhuidse of binneaarse inspuiting.

Wanneer daar binnespiers gespuit word, moet slegs die middelnekareas gebruik word vir inspuiting met 'n naald van nie langer as 30 mm nie.

Moet nie meer as 20 ml op 'n plek spuit nie.

Masseer die inspuitplek om opname te bevorder en swelling te verminder.

In die geval van binneaarse inspuiting moet die inspuiting stadig toegedien word en moet dit tydelik onderbreek word indien daar enige tekens van ongemak ontstaan.

DIE LANGWERKENDE DOSIS MAG SLEGS BINNESPIERS TOEGEDIEN WORD.**Dosis en Aanduidings: Normale Gebruik**

Dier	Siekte	Dosis
Beeste	Hartwater en bosluisoorgedraagde galsiekte (Anaplasrose)	8 ml / 100 kg liggaamsmassa daaglik vir 3 dae.
	Longontsteking, naelstringontsteking, vrotpootjie, septiese gewrigsontsteking	8 ml / 100 kg liggaamsmassa daaglik vir 3 dae.
Perde	Vrotpootjie, naelstringontsteking, septiese gewrigsontsteking, longontsteking, nuwesiekte	8 ml / 100 kg liggaamsmassa daaglik vir 3 dae.
Skape en bokke	Hartwater	4 ml / 50 kg liggaamsmassa daaglik vir 3 dae.
	Vrotpootjie, longontsteking, naelstringontsteking, septiese gewrigsontsteking	4 ml / 50 kg liggaamsmassa daaglik vir 3 dae.
Varke	Vrotpootjie en longontsteking	2 ml / 30 kg liggaamsmassa daaglik vir 3 dae.

Dosis en Aanduidings: Langwerkende Gebruik (Wanneer 'n hoër doeltreffendheid asook 'n langer werking benodig word)

Dier	Siekte	Dosis
Beeste	Hartwater en bosluisoorgedraagde galsiekte (Anaplasrose)	16 ml / 100 kg liggaamsmassa. Herhaal na 3 dae indien nodig.
	Longontsteking, naelstringontsteking, vrotpootjie, septiese gewrigsontsteking	16 ml / 100 kg liggaamsmassa. Herhaal na 3 dae indien nodig.
Skape en bokke	Hartwater	8 ml / 50 kg liggaamsmassa. Herhaal na 3 dae indien nodig.
	Vrotpootjie, longontsteking, naelstringontsteking, septiese gewrigsontsteking	8 ml / 50 kg liggaamsmassa. Herhaal na 3 dae indien nodig.

L.W. Vir vinnige herstel is 'n spoedige en akkurate diagnose noodsaaklik. Dit is dus altyd raadsaam om u veearts vir 'n korrekte diagnose te raadpleeg.