

# DORAJECT



Reg. Nr. G3912 Wet 36/1947  
NSO V13/18.1.8/1190 Wet 13/2003

# +AD<sub>3</sub>E

## SLEGS VIR DIEREGBRUIK

### DORAJECT + AD<sub>3</sub>E LA<sup>†</sup>

'n Langwerkende 1% inspuitbare antiparasitiese middel met vitamien A, D<sub>3</sub> en E vir gebruik by beeste en skape.

### VERSIGTIG

#### BERGINGSAAWYSINGS

Berg in 'n koel, droë plek weg van direkte sonlig.

#### SAMESTELLING

Doramektien	1,0 %	m/v
Vitamien A	3,3 %	m/v
Vitamien D <sub>3</sub>	0,01 %	m/v
Vitamien E	5,0 %	m/v

#### AANWYSINGS

##### Beeste

DORAJECT +AD<sub>3</sub>E is 'n langwerkende 1 % inspuitbare oplossing aangedui vir die behandeling en beheer van maagderm rondewurms, parafilaria, spykerwurms en een-gasheer bosluise.

##### Skape

DORAJECT +AD<sub>3</sub>E is 'n langwerkende 1 % inspuitbare oplossing aangedui vir die behandeling en beheer van skaaprondeurms, skaapbrandsiekte, neuswurm, brommeraanvalle en jeukmyte.

#### WAARSKUWINGS

- MOENIE BEESTE VIR MENSLIKE VERBRUIK SLAG BINNE 35 DAE NA BEHANDELING NIE.
- MOENIE IN SKAPE VIR MENSLIKE VERBRUIK SLAG BINNE 56 DAE NA BEHANDELING NIE.
- MOENIE IN DIERE GEBRUIK WAT MELK VIR MENSLIKE VERBRUIK PRODUSEER NIE.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

#### VOORSORGMAATREËLS

- Moenie leë houers hergebruik nie.
- Moenie rook of eet terwyl die produk hanteer word nie.
- Was hande deeglik na gebruik.
- Inentingsvoorsorgmaatreëls moet geneem word in areas waar die risiko van klostridiale infeksies by beeste soos sponssiekte en kwaadaardige edeem voorkom.
- Studies het getoon dat wanneer doramektien in aanraking met die grond kom, bind dit onmiddellik en stewig met die grond en raak na 'n ruk onaktief. Medisyne houers en enige residuele inhoud moet veilig weggegooi word deur dit te begrawe of verbrand, aangesien vry doramektien negatiewe effekte op visse en sekere water organismes kan hê.

#### GEBRUIKSAANWYSINGS: Gebruik slegs soos aangedui

##### Toediening:

Onderhuids: Spuit onder die los vel agter die skouer of nek of in die dyspiere. Die gebruik van 'n 16-maat 2,0 cm naald word aanbeveel. Gebruik gesteriliseerde gereedskap en volg aseptiese prosedures.

Dosis beeste en skape: 1 ml / 50 kg liggaamsmassa bv.

Liggaamsmassa (kg)	Dosis (ml)	Liggaams-massa (kg)	Dosis (ml)
0 - 25	0,5	151 - 200	4,0
25 - 50	1,0	201 - 250	5,0
50 - 75	1,5	251 - 300	6,0
75 - 100	2,0	301 - 350	7,0
101 - 150	3,0	351 - 400	8,0

#### DOELTREFFENDHEID: Beeste rondewurms

Rondewurms	Onvolwasse	Volwasse	Beheer teen hersmetting vir
Haarwurm ( <i>Haemonchus placei</i> )	*	*	21 dae *
Bruinmaagwurm ( <i>Ostertagia ostertagi</i> )	*	*	21 dae *
Beesbankrotwurm ( <i>Cooperia</i> spp.)	*	*	14 dae *
Haakwurm ( <i>Bunostomum phlebotomum</i> )	*	*	---
Knoppieswurm ( <i>Oesophagostomium radiatum</i> )	*	*	21 dae *
<i>Parafilaria bovicola</i> Valkneusing	** ('n Tussenpose van 70 dae moet verloop na behandeling om toe te laat dat letsels gesond word)		

\* Beheer = ≥ 90 % doeltreffend

\*\* Hulp in die beheer = 60 – 89 % doeltreffend

Hierdie lys bevat die meer belangrike endoparasitiese spesies. Dit kan ook effektief teen ander spesies gebruik word. Vir verdere inligting raadpleeg u veearts

#### DOELTREFFENDHEID: Beeste uitwendige parasiete

Parasiet	Aanbeveling	Herbesmetting periode
Spykerwurm ( <i>Chrysomya bezziana</i> )	Dood spykerwurms wat teenwoordig is wanneer ingespuut word en beskerm teen spykerwurm besmetting vir 35 dae	Beskerm vir 35 dae
Bloubosluise ( <i>Boophilus decoloratus</i> )	Beheer bloubosluise. Behandel elke 45 dae	Verhoed herbesmetting vir 24 dae.

#### DOELTREFFENDHEID: Skaap rondewurms

Rondewurms	Onvolwasse	Volwasse
Haarwurm ( <i>Haemonchus contortus</i> )	*	*
Bankrotwurm ( <i>Trichostrongylus colubriformis</i> )	*	*
Langnekbankrotwurm ( <i>Nematodirus spathiger</i> )	**	**
Bruinmaagwurm ( <i>Teladorsagia circumcincta</i> )	*	*
Knoppieswurm ( <i>Oesophagostomum columbianum</i> )	*	*
Haakwurm ( <i>Gaigeria pachyscelis</i> )	*	*
Grootbekwurm ( <i>Chabertia ovina</i> )	*	*
Witbankrotwurm ( <i>Strongyloides papillosus</i> )	*	*
Longwurm ( <i>Dictyocaulus filaria</i> )	*	*

\* Beheer = ≥ 90 % doeltreffend

\*\* Hulp in die beheer = 60 – 89 % doeltreffend

#### DOELTREFFENDHEID: Skape uitwendige parasiete

Parasiet	Aanbeveling
Neuswurm ( <i>Oestrus ovis</i> )	Hoogs doeltreffend teen alle stadië van neuswurm.
Brommeraanvalle ( <i>Lucilia cuprina</i> )	Hulp in die beheer van brommeraanvalle.
Jeukmyte ( <i>Psoregates ovis</i> )	Hoogs doeltreffend teen jeukmytinfestasie.
Skaapbrandsiekte myte ( <i>Psoroptes ovis</i> )	<b>Enkel inspuiting:</b> Dood skaap brandsiekte myte en beheer 'n uitbraak met 'n enkele inspuiting teen 1,5 ml per 50kg. Dit moet onder toesig van die Staat gedoen word.
	<b>Twee inspuitings:</b> Dit word aanbeveel dat Skaapbrandsiekte beheer word met twee behandelings teen 1ml / 50 kg elk, 7-10 dae uitmekaar.

**LET WEL:** Wanneer 'n uitbraak van brandsiekte by skape behandel word, is dit noodsaaklik dat:

- Al die skape op die plaas akkuraat met die korrekte dosis behandel word en na behandeling gemerk word.
- Al die diere goet 7 - 10 dae na behandeling ondersoek word en enige skape wat nie gemerk is nie moet behandel word.
- Sorg moet gedra word dat die volle dosis aan elke skaap toegedien word.
- Onder sekere omstandighede mag twee behandelings, 7 dae uitmekaar, nodig wees om alle brandsiek-myte te elimineer.

† Makrosikliese laktoon



Registrasiehouer: Kyrion Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika, Tel: 0861 247 463.