

# Doxy-Max 50%

Reg. Nr. G3918 Wet 36/1947

[NS2] V14/17.1.2/1254 Wet 13/2003

## Water oplosbare poeier

**Vir die behandeling van bakteriese asemhaling siektes en maagderm infeksies in hoenders.**

**Bergingsaanwysings:** BERG ONDER 25 °C

**Bevat:** Doksisisiklien hiklaat 500 mg/g

### WAARSKUWINGS

- MOET NIE VIR MENSLIKE VERBRUIK BINNE 9 DAE NA LAASTE BEHANDELING SLAG NIE.
- MOET NIE TOEDIEN AAN HENNE WAT EIERS LÊ VIR MENSLIKE VERBRUIK NIE.
- Behandelde drinkwater moet binne 24 ure ingeneem word.
- Hipersensitiwiteits reaksies, maagderm ongesteldheid, hepatotoksiese- en hematologiese effekte is al aangemeld, maar is ongewoon.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid toestande getoets is, kan dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

### VOORSORGMATREËLS

- Vel kontak met die produk moet vermy word.
- Hou dig geseël nadat houer oopgemaak is.

### GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

- Vir orale toediening in drinkwater

### Dosering

40 mg **Doxy-Max 50%** (20 mg doksisisiklien) per kg liggaamsmassa per dag vir 3 - 4 opeenvolgende dae.

### Doseringstabel

- **1-19 dae oud braaikuikens:** 0.1 g Doxy-Max 50% per 1 ℓ drinkwater
- **20-24 dae oud braaikuikens:** 0.15 g Doxy-Max 50% per 1 ℓ drinkwater
- **25-30 dae oud braaikuikens:** 0.2 g Doxy-Max 50% per 1 ℓ drinkwater

### Vir kleiner hoeveelhede hoenders:

- **1-19 dae oud braaikuikens:** 1 gelykvol maatlepel van 4 g / 5 ml Doxy-Max 50% per 40 liter drinkwater
- **20-24 dae oud braaikuikens:** 1 gelykvol maatlepel van 4 g / 5 ml Doxy-Max 50% per 25 liter drinkwater
- **25-30 dae oud braaikuikens:** 1 gelykvol maatlepel van 4 g / 5 ml Doxy-Max 50% per 20 liter drinkwater

Hierdie doserings kan deur faktore beïnvloed word soos omgewings temperatuur, sout inhoud van voer, gesondheid, bevolkings digtheid, kwaliteit en vloeï van water.

As die behandeling ondoeltreffend is, raadpleeg 'n veearts.

### VOORBEREIDING

- Vars behandelings moet daagliks voorberei word.
- Verseker dat daar genoeg drinkbakke / tepels beskikbaar is vir al die hoenders om behandelde water in te neem.
- Verwyder alle ander waterbronne todat die behandelde water ingeneem is.

