

**DIE BREË SPEKTRUM
ANTIPARASITIESE MIDDEL
MAAK INTERNE + EKSTERNE PARASIETE DOOD***



**PLUS 'n Vitamien A,
D₃ & E aanvulling vir
beeste & skape**



**"n Langwerkende 1 % Doramektien
inspuitbare oplossing aangedui vir die
behandeling en beheer van maagderm
rondewurms, parafilaria, spykerwurms
en een-gasheer bosluise in beeste; en
skaaprondewurms, skaapbrandsiekte,
neuswurms, brommeraannevalle en
jeukmyte in skape.**



Besikbaar in: 50 ml & 500 ml

SLEGS VIR DIEREGBRUIK

DORAJECT + AD3E LA¹

'n Langwerkende 1% inspuibare antiparasitiese middel met vitamien A, D₃ en E vir gebruik by beeste en skape.

VERSIGTIG

BERGINGS- AANWYSINGS

Berg in 'n koel, droë plek weg van direkte sonlig.

SAMESTELLING

Doramektien 1,0 % m/v
 Vitamien A 3,3 % m/v
 Vitamien D₃ 0,01 % m/v
 Vitamien E 5,0 % m/v

AANWYSINGS

Beeste: DORAJECT +AD3E is 'n langwerkende 1% inspuibare oplossing aangedui vir die behandeling en beheer van maagderm rondewurms, parafilaria, spykerwurms en een-gasheer bosluise.

Skape: DORAJECT +AD3E is 'n langwerkende 1% inspuibare oplossing aangedui vir die behandeling en beheer van skaaprondeurms, skaapbrandsiekte, neuswurm, brommeraanvalle en jeukmyte.

WAARSKUWINGS

ONTREKING

- MOENIE BEESTE VIR MENSLIKE VERBRUIK SLAG BINNE 35 DAE NA BEHANDELING NIE.
- MOENIE SKAPE VIR MENSLIKE VERBRUIK SLAG BINNE 56 DAE NA BEHANDELING NIE.
- MOENIE IN DIERE GEBRUIK WAT MELK VIR MENSLIKE VERBRUIK PRODUUSEER NIE.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMATREËLS

- Moenie lê houers hergebruik nie.
- Moenie rook of eet terwyl die produk hanteer word nie.
- Was hande deeglik na gebruik.
- Inentingsvoorsorgmaatreëls moet geneem word in areas waar die risiko van klostridiale infeksies by beeste en skape soos sponssiekte, kwaadaardige edeem en bloednier voorkom.
- Studies het getoon dat wanneer doramektien in aanraking met die grond kom, bind dit onmiddellik en stewig met die grond en raak na 'n ruk onaktief. Medisyne houers en enige residuële inhoud moet veilig weggegooi word deur dit te begrawe of verbrand, aangesien vry doramektien negatiewe effekte op visse en sekere water organismes kan hê.

GEBRUIKSAANWYSINGS: Gebruik slegs soos aangedui

Toediening:

Onderhuids: Spuit onder die los vel agter die skouer of nek of in die nekspiere. Die gebruik van 'n 16-maat 2,0 cm naald word aanbeveel. Gebruik gesteriliseerde gereedskap en volg aseptiese prosedures.

Dosis beeste en skape: 1 ml / 50 kg liggaamsmassa bv.

Liggaams-massa (kg)	Dosis (ml)	Liggaams-massa (kg)	Dosis (ml)
0 – 25	0,5	151 – 200	4,0
25 – 50	1,0	201 – 250	5,0
50 – 75	1,5	251 – 300	6,0
75 – 100	2,0	301 – 350	7,0
101 – 150	3,0	351 – 400	8,0

DOELTREFFENDHEID: Beeste rondewurms

Rondewurms	Onvolwasse	Volwasse	Beheer teen hersmetting vir
Haarwurm (<i>Haemonchus placei</i>)	*	*	21 dae *
Bruinmaagwurm (<i>Ostertagia ostertagi</i>)	*	*	21 dae *
Beesbankrotwurm (<i>Cooperia</i> spp.)	*	*	14 dae *
Haakwurm (<i>Bunostomum phlebotomum</i>)	*	*	---
Knoppieswurm (<i>Oesophagostomum radiatum</i>)	*	*	21 dae *
Valskneusing <i>Parafilaria bovicola</i>	** ('n Tussenpose van 70 dae moet verloop na behandeling om toe te laat dat letsels gesond word)		

* Beheer ≥ 90% doeltreffend

** Hulp in die beheer = 60 – 89% doeltreffend

Hierdie lys bevat die meer belangrike endoparasitiese spesies. Dit kan ook effektief teen ander spesies gebruik word. Vir verdere inligting raadpleeg u veearts.

DOELTREFFENDHEID: Beeste uitwendige parasiete

Parasiet	Aanbeveling	Herbesmetting periode
Spykerwurm (<i>Chrysomya bezziana</i>)	Dood spykerwurms wat teenwoordig is wanneer ingespuut word en beskerm teen spykerwurm besmetting vir 35 dae	Beskerm vir 35 dae
Bloubosluise (<i>Rhipicephalus decoloratus</i> en <i>Rhipicephalus microplus</i>)	Beheer bloubosluise. Behandel elke 45 dae	Verhoed herbesmetting vir 24 dae.

DOELTREFFENDHEID: Skaap rondewurms

Rondewurms	Onvolwasse	Volwasse
Haarwurm (<i>Haemonchus contortus</i>)	*	*
Bankrotwurm (<i>Trichostrongylus colubriformis</i>)	*	*
Langnekbankrotwurm (<i>Nematodirus spathiger</i>)	**	**
Bruinmaagwurm (<i>Teladorsagia circumcincta</i>)	*	*
Knoppieswurm (<i>Oesophagostomum columbianum</i>)	*	*
Haakwurm (<i>Gaigeria pachyscelis</i>)	*	*
Grootbekwurm (<i>Chabertia ovina</i>)	*	*
Witbankrotwurm (<i>Strongyloides papillosus</i>)	*	*
Longwurm (<i>Dictyocaulus filarial</i>)	*	*

* Beheer ≥ 90% doeltreffend

** Hulp in die beheer = 60 – 89% doeltreffend

DOELTREFFENDHEID: Skaap uitwendige parasiete

Parasiet	Aanbeveling
Neuswurm (<i>Oestrus ovis</i>)	Hoogs doeltreffend teen alle stadia van neuswurm.
Brommeraanvalle (<i>Lucilia cuprina</i>)	Help in die beheer van brommeraanvalle.
Jeukmyte (<i>Psoroptes ovis</i>)	Hoogs doeltreffend teen jeukmytinfestasie.
Skaap brandsiekte myte (<i>Psoroptes ovis</i>)	Enkel inspuiting: Dood skaap brandsiekte myte en beheer 'n uitbraak met 'n enkele inspuiting teen 1,5 ml per 50kg. Dit moet onder toesig van die Staat gedoen word.
	Twee inspuitings: Dit word aanbeveel dat Skaapbrandsiekte beheer word met twee behandelings teen 1 ml per 50 kg elk, 7-10 dae uitmekaar.

LET WEL: Wanneer 'n uitbraak van brandsiekte by skape behandel word, is dit noodsaaklik dat:

- Al die skape op die plaas akkuraat met die korrekte dosis behandel word en na behandeling gemerk word.
- Al die diere moet 7 - 10 dae na behandeling ondersoek word en enige skape wat nie gemerk is nie moet behandel word.
- Sorg moet gedra word dat die volle dosis aan elke skaap toegedien word.
- Onder sekere omstandighede mag twee behandelings, 7 dae uitmekaar, nodig wees om alle brandsiekmyte te elimineer.