

OM DOSE³

① ② ③[†]

Reg. Nr. G3916 Wet 36/1947
NS0 V13/18.1.8/1188 Wet 13/2003

SLEGS VIR DIEREGBRUIK

AANDUIDINGS

Orale doseermiddel vir skape en bokke.

SAMESTELLING

Ivermektien 0,2% m/v
Triklabendasool 10,0% m/v
Levamisool 8,0% m/v

BERGINGSAANWYSINGS

Berg in 'n koel droë plek, weg van sonlig.

WAARSKUWINGS

- MOENIE DIERE VIR MENSLIKE VERBRUIK BINNE 32 DAE NA LAASTE BEHANDELING SLAG NIE.
- LAKTERENDE SKAPE OF BOKKE MOENIE BEHANDEL WORD AS DIE MELK VIR MENSLIKE VERBRUIK AANGEWEND WORD NIE, EN OOK NIE BINNE 32 DAE VOOR LAMTYD NIE.
- Inenting teen klostridiale siektes bv. bloednier (enterotoxaemia), word aanbeveel voordat met OVI DOSE 3 behandel word.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMAATREËLS

- Moenie leë houers hergebruik nie en verwyder houers en oorskiet inhoud deur te brand of begrawe om besoedeling van waterbronre te vermy.

GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

- MOET NIE MET ENIGE ANDER PRODUK VERDUN OF MENG NIE.

Dosis:

- Doseer oraal teen 1 ml per 10 kg.

Dosis tabel		
Liggaaams massa (kg)	Dosis volume (ml)	
Tot 20	2,0	
30	3,0	
40	4,0	
50	5,0	
60	6,0	

DOELTREFFENDHEID: INWENDIGE PARASIETE		
RONDEWURMS	Onvolwasse	Volwasse
Haarwurm (<i>Haemonchus contortus</i>)	*	*
Bruinmaagwurm (<i>Teladorsagia circumcincta</i>)	*	*

Bankrotwurm (<i>Trichostrongylus colubriformis</i>)	*	*
Langnekbankrotwurm (<i>Nematodirus spathiger</i>)	*	*
Haakwurm (<i>Gaigeria pachyscelis</i>)	*	*
Witbankrotwurm (<i>Strongyloides papillosus</i>)	*	*
Knoppieswurm (<i>Oesophagostomum columbianum</i>)	*	*
Grootbekwurm (<i>Chabertia ovina</i>)	*	*
Longwurm (<i>Dictyocaulus filaria</i>)	*	*
Sambokwurm (<i>Trichuris spp.</i>)		*
LEWERSLAK	Alle stadium	
Lewerslak (<i>F. hepatica</i>)	*	
Reuse Lewerslak (<i>F. gigantica</i>)	*	

* Beheer = ≥ 90 % doeltreffend

- Gereelde behandeling met 'n middel wat doeltreffend is teen vroeë onvolwasse lewerslak kan besmetting van weivelde verminder.
- OVI DOSE 3 dood alle stadia van lewerslak van 2 weke oud en word dus aanbeveel vir die behandeling van akute- en kroniese uitbrake.
- Behandel alle skape en bokke voordat hulle op potensieel gevaarlike weiding toegelaat word, ten einde besoedeling van die weiding en gevolglike besmetting van die varswaterslak (tussengasheer) te vermy.
- Skape en bokke op besmette weiding moet elke 8 weke met OVI DOSE 3 behandel word om die lewensiklus van lewerslak te breek en die lewer te beskerm. Sodoende word die lewerslaksist van die weiding verwijder en die ontwikkelende slakte word vernietig voor hulle eiers kan lê.
- Behandel alle skape en bokke ± 2 weke nadat hulle van besmette weidings verwijder is.
- Laat winter behandeling van skape en bokke wat blootgestel was aan lewerslak gedurende die somer is daarop gemik om draerdiere skoon te maak en om herbesmetting van die varswaterslak te verhoed.
- Perde en donkies is draers van lewerslak en kan weivelde herbesmet. Raadpleeg u veearts vir verdere advies.

DOELTREFFENDHEID: UITWENDIGE PARASIETE

- Neuswurm: Beheer alle stadia (1^{ste}, 2^{de}, en 3^{de} stadium larwes).
- Beheer Australiese jeukmyte.

† ① Makrosikliese laktoon, ② Bensimidazool,
③ Imidotiasool



Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07,
Eenheid 45C, 45 Parkview Straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr.
31, Centurion, 0157, Suid Afrika. Tel: 0861 247 463.