

Slegs Vir Dieregebruik  
**Curaclox DC** Intramammary  
Reg. No. G 2617 (Wet 36/1947)

**Berging:**

Berg in 'n koel plek.

**Samestelling:**

Elke 4,5 g spuit bevat 500 mg kloksasillien (as die sensitiensout) en 250 mg ampisillien (as trihidraat) in 'n langwerkende basis.

**Aanduidings:**

Curaclox DC is aangewys vir die voorkoming en behandeling van mastitis gedurende die droë periode.

**Waarskuwings:**

Melk vir menslike verbruik mag slegs 60 uur na kalwing gebruik word (d.i. 28 dae plus 60 uur na behandeling). Diere mag slegs 28 dae na laaste behandeling vir menslike verbruik geslag word.

Moenie in lakterende diere, waarvan melk vir menslike verbruik bestem is, gebruik nie.

Moenie gebruik binne 28 dae voor kalwing nie.

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.

Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

**Gebruiksaanwysings:**

Gebruik slegs soos aangedui.

Na die laaste melking van 'n laktasie moet die spene skoongemaak en ontsmet word.

Dien die hele inhoud van een spuit toe per kwart via die speenkanaal.

**Registrasiehouer:**



iPharma (Edms) Bpk  
(Reg:2010/000192/07)  
124 Elevation Laan,  
Randjesfontein, Midrand, 1683  
[www.ipharma.co.za](http://www.ipharma.co.za)

**Versprei deur:**



Kyron Animal Health (Edms) Bpk  
(Reg. Nr. 2004/021847/07)  
Eenheid 45C, 45 Parkview straat, Highway  
Besigheid Park, Rooihuiskraal Ext. 31,  
Centurion, 0157.  
Tel: 0861 247 463

Namibië: V00/16.1/265